

防癌体检套餐					
序号	疾病类别	高危人群	筛查项目	价格 (元)	说明
1	肺癌	年龄>40岁，至少合并以下一项危险因素者：吸烟>20年包，戒烟时间不足15年；被动吸烟；有职业暴露史（石棉、铀、氡接触史）；有恶性肿瘤病史或肺癌家族史；有慢性阻塞性肺疾病或弥漫性肺纤维化病史。	低剂量螺旋CT，肿瘤标志物CEA/NSE/CY21-1/SCCA	407.76	高危人群每年做一次低剂量CT扫描；对于肺部结节根据结节危险程度及医生建议进行复查。
2	食管癌、胃癌	年龄在40-69岁之间或具有以下因素之一：幽门螺杆菌感染伴有腹痛、腹胀、反酸、烧心等上腹部不适症状；喜食高盐、烟熏食品；患萎缩性胃炎、慢性胃溃疡、胃息肉、反流性食管炎等疾病；有胃癌或食管癌家族史；原因不明恶性贫血；来自食管癌高发区或长期居住；便潜血阳性；胃癌术后残胃。	无痛胃镜；常规心电图、输血常规，血常规，碳13检测幽门螺杆菌，肿瘤标志物CEA/CA724/CA199/SCCA	1368.85	根据检查结果决定复查胃镜时间，萎缩性胃炎每年复查1次胃镜；轻度和中度异性增生胃镜检查间隔为3-5年；
3	结直肠癌	年龄在40-74岁之间或具有以下因素之一：膳食习惯不良（长期脂肪餐或红肉摄入）；有结直肠癌家族史；患溃疡性结肠炎；患结肠息肉；便潜血阳性；大肠腺瘤治疗后；大便习惯改变（便秘、腹泻）；大便性状改变（大便变细）；大便性质改变（血便、粘液便）；腹部固定部位疼痛。	无痛肠镜；常规心电图、输血常规，血常规，肿瘤标志物CEA/CA242/CA199	1213.66	根据检查结果决定复查肠镜时间，直径≥1厘米的腺瘤，绒毛结构≥25%的腺瘤（绒毛状腺瘤或混合性腺瘤），伴高级别上皮内肿瘤的其它病变，1年内复查肠镜；溃疡性结肠炎每2年复查肠镜；其它良性病变5-10年复查一次肠镜。

防癌体检套餐					
序号	疾病类别	高危人群	筛查项目	价格(元)	说明
4	肝癌	年龄在40-69岁之间或具有以下因素之一：有肝癌家族史；乙肝及丙肝现患或携带；肝硬化；酒精或非酒精性肝病；自身免疫性肝炎。	腹部彩超、甲胎蛋白AFP、CEA，肝功能2号，HBV-DNA，乙肝五项	438. 68	建议半年筛查一次甲胎蛋白AFP检查和肝脏彩超，必要时可进一步行上腹部CT平扫+增强
5	胰腺癌	40岁以上伴有下列任意一项因素：有胰腺癌家族史、糖尿病史；有长期吸烟、饮酒、高脂肪和高蛋白饮食；无明显诱因的中上腹饱胀不适、腹痛、食欲不振、乏力、腹泻、消瘦或腰背部酸痛等症状；慢性胰腺炎反复发作；CA199升高，无家族史的新近突发糖尿病。	中腹部（胰腺）256CT平扫，肿瘤标志物CEA/CA199/CA125	411. 06	必要时进一步做核磁平扫加增强
6	甲状腺癌	有头颈部放射线照射史；有甲状腺癌家族史；甲状腺结节大于1厘米，且生长迅速，伴持续性声音嘶哑、发声困难、呼吸困难或吞咽困难，并可排除声带炎症、息肉；甲状腺结节大于1厘米，伴颈部淋巴结肿大。	甲状腺彩超、甲状腺功能、甲状腺抗体、甲状腺球蛋白	378. 06	高危人群3个月或6个月复查一次甲状腺彩超
7	乳腺癌	35-69岁之间或具有以下因素之一者：月经初潮时间早、绝经年龄晚；未婚、未育、未哺乳；绝经后肥胖；长期精神压抑、心情郁闷；头胎足月产年龄超过35岁；雌激素替代治疗者、长期口服避孕药；胸部放疗史；乳腺手术史；乳腺肿物或乳头溢液；乳腺导管或小叶重度不典型增生。	乳腺彩超，乳腺钼靶、肿瘤标志物CEA/CA153	619. 36	建议所有女性35岁开始一年做一次乳腺彩超检查；45岁以上（含45岁）的女性采用超声检查结合X线检查（即钼靶），钼靶绝经前隔年一次，绝经后每年一次；

防癌体检套餐					
序号	疾病类别	高危人群	筛查项目	价格(元)	说明
8	宫颈癌	人乳头瘤病毒感染者；免疫功能低下者；性生活过早者；有多个性伴侣者；有宫颈病史的女性。	宫颈液基细胞涂片，人乳头瘤病毒，肿瘤标志物CEA/SCCA	679.36	21-29岁采用每3年筛查一次宫颈液基细胞涂片；30-65岁每5年筛查一次宫颈液基细胞涂片联合人乳头瘤病毒，或每3年筛查一次宫颈液基细胞涂片；>65岁且多次检查均示阴性，则结束筛查；全子宫切除术后无宫颈且既往20年中无CIN2、CIN3、AIS和宫颈癌病史者无须防癌体检
9	前列腺癌	年龄>50岁的男性；年龄>45岁且具有前列腺癌家族史的男性；年龄>40岁且基线PSA大于1ug/L的男性。	前列腺彩超，前列腺肿瘤标志物FPSA/TPSA	199.36	每年检查一次彩超和肿瘤标志物FPSA/TPSA
10	脑部肿瘤	脑部肿瘤信号：剧烈头痛，常清晨发作，活动后缓解；喷射性呕吐；视力模糊、视觉障碍；精神异常，常有兴奋、躁动、遗忘、压抑等表现；单侧肢体感觉异常，痛觉、温觉、震动觉减退或消失；耳鸣、耳聋，多在打电话时一耳听到，一耳听不到；偏瘫或踉跄、醉酒步态；幻嗅。	头部16排CT平扫	165	必要时头颅CT增强扫描或头颅核磁扫描
11	胆囊癌	慢性结石性胆囊炎患者（结石越大风险越高）；胆囊息肉直径超过1厘米，特别是单发、宽蒂息肉；瓷化胆囊或胆囊萎缩；原发性硬化性胆管炎。	腹部彩超、肿瘤标志物CEA/CA199/CA125，肝功六项	291.06	每半年复查一次腹部彩超、肿瘤标志物CEA/CA199/CA125